

อบต.บ้านไร่



เลขรับ ๔๕๖๗/๒๐๒
วันที่ ๑๑/๒๖/๒๕๖๕
เวลา

ที่ ขย ๑๓๓๘/ว๒๖๖

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
ถนนสุนทรารายณ์ ขย. ๓๖๒๓๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) จังหวัดชัยภูมิและมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room)
เรียน สาธารณสุขอำเภอ/ท้องถิ่นอำเภอ/นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง/นายกเทศมนตรีตำบล เทพสถิต/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/กำนันทุกตำบล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๐๐๐๘/ว ๖๖๙ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room)

ตามที่ประเทศไทย ได้ประกาศการตรวจพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) จากตัวอย่างที่ได้เก็บจากโรงฆ่าสัตว์ กรมปศุสัตว์จึงได้เร่งดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐ โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการประสานงานภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อำเภอเทพสถิตจึงขอส่งสำเนาหนังสือและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) ตามมาตรการเตรียมความพร้อมในการรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน นายท อบต.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ
แจ้ง.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววสินดา จังโกฏี)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิทา กุ๋เอี่ยม)

นายอำเภอเทพสถิต

จ.อ.

(อนุชิตี พึ่งกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายศุภกฤษ ฐานเจริญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต

โทร. ๐๘๑-๙๕๕๐๘๒๙

โปรดส่งมา

(นายมนตรี สุทินาวัฒน์)

นายกรานต์ เขตจันทัก



๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) จังหวัดชัยภูมิและมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๒๕๖๕ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานปลัดตัวอำเภอเทพสถิต
 วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๕
 วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕
 ๑๗.๐๐ น.

๒. ข่าวกุสสัตว์

จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ประเทศไทย ได้ประกาศตรวจพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จากตัวอย่างที่เก็บมาจากโรงฆ่าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น กรมปศุสัตว์จึงได้เร่งดำเนินการตามนโยบายฯ พณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการประสานงานภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ท่านดำเนินการตามมาตรการในการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ดังต่อไปนี้

๑. การเฝ้าระวังโรค

๑.๑ คำนิยามสุกรสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทางอาการ คือ ฟาร์มที่มีการตายแบบเฉียบพลัน มากกว่า ๓% ใน ๒ วัน หรือรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) มีการตายเฉียบพลันตั้งแต่ ๑ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน หรือสุกรป่วย โดยมีอาการดังต่อไปนี้ ใช้สูง หรือนอนสุม ร่วมกับหึ่งเสียงเป็นเลือดหรือผิวหนังแดง หรือมีจุดเลือดออกหรือรอยขีดโดยเฉพาะใบหูและท้อง มีอาการไอ แท้ง หรือขาหลังไม่มีแรง

๑.๒ ให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าบริการช่วยงานสัตวแพทย์เฝ้าระวังทางอาการในสุกรตามนิยามข้อ ๑.๑ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานด้วยการบันทึกลงในแบบเฝ้าระวังทางอาการในสุกรผ่านแอปพลิเคชัน DLD ๔.๐

๑.๓ กรณีพบอาการสุกรสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้รายงานให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิทราบทันที

๑.๔ แจ้งประชาสัมพันธ์เตือนภัยและให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้แก่เกษตรกร ประชาชน และสถานศึกษารับทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้เกษตรกรสังเกตอาการสุกรที่เลี้ยง หากพบสุกรป่วยตายผิดปกติหรือเป็นไปตามนิยามของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไปในวงกว้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

.../๑.๕ ขอความ..

- ทำความสะอาดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณที่พบสุกรป่วยหรือตายรวมทั้งบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรคทั้งการผสมยาฆ่าเชื้อในอัตรารส่วนที่กำหนดและการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องโดยพ่นให้เปียกชุ่ม

- ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวเพื่อควบคุมไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่าภายในเขตประกาศข้างต้น และเข้า ออก หรือผ่าน พื้นที่ประกาศ โดยคำนึงถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- ลดประชากรสุกรในกลุ่มเสี่ยง โดยประสานให้มีการส่งสุกรที่พบอาการป่วยเข้าโรงฆ่าภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่

- จัดชุดเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังทางอากาศในพื้นที่รัศมี ๑ กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค หากพบสุกรป่วยตายผิดปกติ หรือเข้านิยามของโรคคอหอยคุดแอฟริกาในสุกรให้ดำเนินการควบคุมโรคโดยทันที

- เฝ้าระวังและค้นหาโรคเพิ่มเติมในรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดที่พบสุกรหรือหมูป่าป่วยหรือตายด้วยโรคคอหอยคุดแอฟริกาในสุกรอย่างเข้มงวด โดยให้สำรวจสุกรและหมูป่าป่วยหรือตายเป็นประจำทุกวัน เป็นเวลา ๓๐ วัน ภายหลังจากที่พบสุกรหรือหมูป่าตัวสุดท้ายป่วยหรือตาย รวมทั้งจะต้องมีการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและหมูป่าทุกราย (เคาะประตู) โดยสอบถามอาการหากพบสุกรหรือหมูป่าป่วยหรือตายผิดปกติให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทันที

๓. เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในสุกร สถาบันการเงินและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ได้มีโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ทั้งการจัดสินเชื่อพิเศษ หรือโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับมาเลี้ยงสุกรได้ใหม่ แต่เนื่องจากโรคคอหอยคุดแอฟริกา เป็นเชื้อโรคที่มีความทนทานในสิ่งแวดล้อม ไม่มียารักษา และไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งการป้องกันโรคที่ดีที่สุด คือ การปรับปรุงการเลี้ยงให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity System) ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการนำสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ทั้งในส่วนของเกษตรกร หน่วยงานราชการ และอื่นๆ ขอให้ประสานหน่วยงานปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูล หรือคำแนะนำ พร้อมทั้งตรวจสอบแหล่งที่มาของสุกร ผลการตรวจโรค และการปรับปรุงฟาร์มของเกษตรกรให้สามารถป้องกันโรคได้ก่อนนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

วิมล นามะธนาพรเทพสถิต

ขอแสดงความนับถือ

- ทั่วหวัดให้ จัดเลี้ยงคอกหมูใหม่
ให้ควรรวสัตว์คอกใหม่และคอกเดิม
คอกคอก 11คอกให้คอกใหม่
- ที่คอกใหม่คอกหมู หรือ
11/9 0คอก 2คอก 3คอก 4คอก




(นายชาญชัย ศรีศรีวิชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ศิริ 11/9 0คอก 2คอก 3คอก 4คอก



วิมล นามะธนาพรเทพสถิต
11/9 0คอก 2คอก 3คอก 4คอก



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

โทร ๐ - ๔๔๘๑ - ๒๓๓๔ ต่อ ๑๓ ๖๒๑ ๖๖

โทรสาร ๐ - ๔๔๘๑ - ๒๓๓๔ ต่อ ๑๘

(นายสิทธิ ภูเอี่ยม)
นายอำเภอเทพสถิต

๑.๕ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหาร กัสดาคาร โรงแรม โรงอาหาร สถานประกอบเลี้ยง ให้งดจำหน่าย จ่าย แจกเศษอาหารเหลือจากการรับประทานให้ผู้นำไปเลี้ยงสุกร

๑.๖ เข้มงวดการเฝ้าระวังโรคและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานที่เลี้ยงสุกรรายย่อย โรงฆ่าสุกร แหล่งรวมสุกร เป็นต้น

๑.๗ การปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพและปรับระบบการเลี้ยง

- เข้มงวดการปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เช่น มีรั้วรอบฟาร์ม เพื่อลดโอกาสสัมผัสสุกรจากภายนอก ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาในฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกร ก่อนเข้าฟาร์มจะต้องมีการทำลายเชื้อโรคและเปลี่ยนรองเท้าทุกครั้ง ไม่เลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารหากจำเป็นต้องนำเศษอาหารไปต้มก่อน ที่อุณหภูมิ ๗๐ องศาเซลเซียส อย่างน้อย ๓๐ นาที ไม่อนุญาตให้ยานพาหนะภายนอก เข้ามาภายในฟาร์ม หากจำเป็นต้องมีการทำลายเชื้อโรคหมั่นทำความสะอาดคอกให้แห้งมีการถ่ายเทอากาศที่ดี และพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นประจำสัปดาห์ละ ๑ - ๒ ครั้ง เป็นต้น

- ส่งเสริมให้ฟาร์มสุกรรายย่อยยกระดับฟาร์มสุกรของเกษตรกรรายย่อย ให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM) เพื่อลดความเสี่ยงของการนำเชื้อโรคเข้ามาภายในฟาร์มและลดโอกาสของสุกรภายในฟาร์มออกไปสัมผัสกับสุกรอื่น

๒. การควบคุมโรค

๒.๑ กำหนดสถานที่สำหรับการฝังซากสุกรที่เป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งต้องเป็นพื้นที่น้ำท่วมไม่ถึง และห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือไกลจากชุมชน และใกล้เคียงกับฟาร์มที่เกิดโรคที่สุด ทั้งนี้ พื้นที่ที่ใช้ฝังสุกรควรมีขนาดโดยเฉลี่ย ๐.๓ ลูกบาศก์เมตร/ตัว

๒.๒ เมื่อพบสุกรสงสัยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้ดำเนินการ ดังนี้

- สอบสวนโรคเบื้องต้น อาทิ ประวัติการฉีดวัคซีน การนำสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่ การเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า - ออกนอกฟาร์มในระยะเวลา ๒ สัปดาห์ก่อนพบสัตว์แสดงอาการ

- เก็บตัวอย่างเลือดหรือน้ำลายสุกรทุกโรงเรือน ๆ ละ ๑๕ ตัวอย่าง โดยพิจารณาเก็บตัวอย่างจากสุกรที่แสดงอาการป่วย หรือซึม หรือมีไข้ หรือกินอาหารลดลง หรือไม่กินอาหาร หรือท้องเสียอุจจาระเป็นเลือด หรือแม่สุกรแท้ง เป็นลำดับแรก ร่วมกับการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทุกโรงเรือน โรงเรือนละ ๓ บริเวณละ ๕ ตำแหน่ง ส่งตรวจ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง จ.สุรินทร์ และให้ระบุในใบนำส่งตัวอย่างเป็นกิจกรรมเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

- สังกักสุกรรวมฝูง และแยกสุกรป่วยออกจากสุกรที่มีอาการปกติ

- ฝังซากสุกรตาย โดยให้ฝังซากตามหลักวิชาการทางสัตวแพทย์

๒.๓ กรณีผลทางห้องปฏิบัติการยืนยันเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ให้ดำเนินการทำลายสัตว์ที่แสดงอาการตามนิยามของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ยืนยันว่าเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรค ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด ทั้งนี้ ให้ชดใช้ราคาแก่เจ้าของสัตว์ หรือซากสัตว์ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของราคาสัตว์หรือซากสัตว์ที่อาจขายได้ในตลาดท้องถิ่นก่อนเกิดโรคระบาด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกทำลายเนื่องจากเป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เกษตรกรที่ถูกทำลายสุกร ต้องพักเลี้ยงอย่างน้อย ๙๐ วัน

.../ - ทำความสะอาด...



คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ
ที่ ๒๕๘๘ / ๒๕๖๕

เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room)
จังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ประเทศไทย ได้ประกาศตรวจพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จากตัวอย่างที่เก็บมาจากโรงฆ่าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคระบาดสัตว์ที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ไม่ก่อให้เกิดโรคในคนและสัตว์ชนิดอื่น เกิดโรคได้เฉพาะในสุกรเท่านั้น โดยเป็นโรคที่มีความรุนแรงและก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสุกรทุกกลุ่มอายุ ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันและยาในการรักษาโรค หากมีการระบาดเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงทางด้านอาหารเป็นอย่างมาก

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการประสานงานภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จังหวัดชัยภูมิจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการระดับจังหวัด

- | | |
|---|------------------|
| ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดชัยภูมิ (ฝ่ายทหาร) | กรรมการ |
| ๔. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ | กรรมการ |
| ๕. ปลัดจังหวัดชัยภูมิ | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๕ นครราชสีมา | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ | กรรมการ |
| ๙. ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ | กรรมการ |
| ๑๐. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ | กรรมการ |
| ๑๑. นายอำเภอทุกอำเภอ | กรรมการ |
| ๑๒. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชัยภูมิ | กรรมการ |

๑๔. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.สุรินทร์	กรรมการ
๑๖. พาณิชยจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
๑๗. ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
๑๘. ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
๑๙. ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
๒๐. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๑	กรรมการ
๒๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๒	กรรมการ
๒๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๓	กรรมการ
๒๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๓๐	กรรมการ
๒๔. ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
๒๕. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว	กรรมการ
๒๖. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง	กรรมการ
๒๗. ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	กรรมการและเลขานุการ
๒๘. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙. หัวหน้ากลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

(๑) กำหนดนโยบายและดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan) และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline) ของกรมปศุสัตว์

(๒) เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรและปัจจัยต่าง ๆ เพื่อรับมือกรณีเกิดการระบาดของโรคคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในจังหวัดชัยภูมิ

(๓) กรณีที่มีการระบาดของโรคคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเตรียมความพร้อม ฯ เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว

๒. คณะกรรมการระดับอำเภอ

๑. นายอำเภอ	ประธานกรรมการ
๒. สาธารณสุขอำเภอ	กรรมการ
๓. ท้องถิ่นอำเภอ	กรรมการ
๔. นายกองค้กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน	กรรมการ
๖. กำนันทุกตำบล	กรรมการ
๗. ปศุสัตว์อำเภอ	เลขานุการและกรรมการ
๘. สัตวแพทย์/เจ้าพนักงานสัตวบาล ประจำอำเภอ	ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ
๙. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ	ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ

อำนาจหน้าที่

(๑) เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรและปัจจัยต่างๆ เพื่อรับมือกรณีเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับอำเภอ

(๒) กรณีที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเตรียมความพร้อมฯ เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว

๓. คณะกรรมการระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. นายกองค้กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประธานกรรมการ
๒. รองนายกองค้กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรรมการ
๓. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรรมการ
๔. หัวหน้าส่วนการคลัง	กรรมการ
๕. หัวหน้าส่วนเกษตร	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	กรรมการ
๗. ปศุสัตว์อำเภอ	กรรมการ
๘. สาธารณสุขอำเภอ	กรรมการ
๙. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน	กรรมการ
๑๐. พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์	กรรมการ
๑๑. อาสาสมัครสาธารณสุข	กรรมการ
๑๒. อาสาสมัครปศุสัตว์	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เลขานุการและกรรมการ
๑๔. สัตวแพทย์/เจ้าพนักงานสัตวบาล ประจำอำเภอ	ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ

อำนาจหน้าที่

(๑) เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรและปัจจัยต่างๆ เพื่อรับมือกรณีเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับตำบล

(๒) กรณีที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเตรียมความพร้อมฯ เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว

๔. คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน

- ๑. กำนัน ประธานกรรมการ
- ๒. ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ
- ๓. อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการ
- ๔. อาสาสมัครปศุสัตว์ กรรมการ
- ๕. สัตวแพทย์/เจ้าพนักงานสัตวบาล เลขานุการและกรรมการ

อำนาจหน้าที่

(๑) เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรและปัจจัยต่างๆ เพื่อรับมือกรณีเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับหมู่บ้าน

(๒) กรณีที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเตรียมความพร้อมฯ เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๗

(นายไกรสร กองฉลาด)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ



ข่าวสารปศุสัตว์ชัยภูมิ



http://pvtc.cpm.dld.go.th e-mail: pvtc.cpm@dld.go.th โทรศัพท์ 0-4312-9333, 0-4311-9457 โทรสาร 0-4311-2334 ต่อ 13

ที่ปรึกษา : ศพ.ญ.ศรีสมัช ใจดีวนิช, ศพ.ญ.ทับทอง บุญเดิม, นายอโนชา อินทรศรี, น.สพ.ชนพอล นาครินทร์, นายวิวัฒน์กิตติพรหม

จังหวัดชัยภูมิ เน้นย้ำมาตรการการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคคอตีบในสุกร เกษตรกรที่จะนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ กรุณาปรึกษาปศุสัตว์ในพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ประกาศพบโรคคอตีบในสุกร เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากการระดมพลหน่วยเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ดำเนินการค้นหาและสอบสวนโรคคอตีบในสุกรในจังหวัดราชบุรีและนครปฐม โดยได้ทำการเก็บจำนวนตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวินิจฉัยหาห้องปฏิบัติการพบผลบวกต่อสารพันธุกรรมของโรคคอตีบในสุกร จำนวน ๑ ตัวอย่าง ประกอบกับเริ่มพบการระบาดของโรคคอตีบในสุกรในบางจังหวัดมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมโรคคอตีบในสุกรให้สงบโดยเร็ว และป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจายเป็นวงกว้าง กรมปศุสัตว์จึงเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคคอตีบในสุกร เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้ดำเนินการ และยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. โรคคอตีบในสุกร ไม่ติดต่อสูคน เป็นโรคติดต่อไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังไม่มีวัคซีนและวิธีการรักษาที่จำเพาะสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือซากสุกรได้นานหลายเดือน ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้กำหนดนิยามสุกรสงสัยโรคคอตีบในสุกรทางอาการ ดังนี้

- ฟาร์มที่มีการตายแบบเฉียบพลัน มากกว่า ๓% ใน ๒ วัน หรือรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) มีการตายเฉียบพลันตั้งแต่ ๑ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน
- สุกรป่วย โดยมีอาการดังต่อไปนี้ ใช้สูง หรือนอนสุม ร่วมกับท้องเสียเป็นเลือดหรือมีวุ้นแดง หรือมีจุดเลือดออกหรือรอยขีดโดยเฉพาะใบหูและท้อง มีอาการไอ แห้งหรือขาดน้ำไม่มีแรง

๒. เมื่อพบสุกรป่วยตายผิดปกติ/มีอาการตามนิยามโรค ให้ดำเนินการดังนี้

แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีเพื่อเร่งเข้าตรวจสอบและป้องกันการแพร่กระจายของโรคไปในวงกว้าง หรือติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ - ๘๑๒๓๓๔ ต่อ ๑๓

- กักสุกรร่วมฝูง และแยกสุกรป่วยออกจากสุกรที่มีอาการปกติ
- ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร หรือซากสุกร ออกจากฟาร์มที่เกิดโรค
- ห้ามผ่าซากในฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงโดยเด็ดขาด

ทำความสะอาดคอกสุกรและพื้นของโรงเรือนด้วยผงซักฟอก และพ่นหรือราดน้ำยาฆ่าเชื้อ กลุ่ม อีเทอร์ คลอโรฟอร์ม และสารประกอบไอโอดีนหรือโซดาไฟให้ทั่วบริเวณ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง หรือจนกว่าไม่พบสุกรป่วย และจัดให้มีอ่างใส่น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับบุคคลที่เข้าออกคอกสัตว์

๓. การเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกา

สังเกตสุกรที่เลี้ยงเป็นประจำ หากพบแสดงอาการป่วยให้แจ้งผู้คุมชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที

ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบุคคลและสิ่งของที่เข้าออกฟาร์มอย่างเข้มงวด

เข้มงวดการปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เช่น ห้ามบุคคลภายนอกเข้า - ออกฟาร์มโดยเด็ดขาด มีรั้วรอบฟาร์มเพื่อลดโอกาสสัมผัสสุกรจากภายนอก ก่อนเข้าฟาร์มจะต้องมีการทำลายเชื้อโรคและเปลี่ยนรองเท้าทุกครั้ง หมั่นทำความสะอาดคอกให้แห้งมีการถ่ายเทอากาศที่ดีและพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นประจำสัปดาห์ละ ๑ - ๒ ครั้ง

ใช้อาหารสัตว์จากแหล่งที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ ไม่ควรใช้เศษอาหารเหลือมาเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องใช้เศษอาหารจะต้องผ่านกระบวนการต้มด้วยอุณหภูมิอย่างน้อย ๗๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค

ห้ามฆ่าและหมักที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุภายในบริเวณฟาร์ม ให้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทันที เพื่อดำเนินการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างส่งตรวจทันทีในกรณีที่พบหมูป่วยด้วยอาการตามนิยาม

๔. ก่อนนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ ต้องทำอย่างไร

กรณีเกษตรกรที่ถูกทำลายสุกร ต้องพักเลี้ยงอย่างน้อย ๔๐ วัน ก่อนนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่

ยกระดับฟาร์มสุกรของเกษตรกรรายย่อยให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM) เพื่อลดความเสี่ยงของการนำเชื้อโรคเข้ามาภายในฟาร์มและลดโอกาสของสุกรภายในฟาร์มออกไปสัมผัสกับสุกรอื่น

ต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของสุกรก่อนเข้าฟาร์ม พิจารณาซื้อลูกหมูจากฟาร์มที่มีการจัดการที่ดีและมีการป้องกันโรค ไม่ควรซื้อจากพ่อค้าเร่ที่บรรทุกหมูไปขาย

ท้ายนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ฝากถึงประชาชนว่า การประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ให้รอบคอบ หากมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๘๑-๒๓๓๔๔ ต่อ ๑๓ หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้านท่าน