



ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๕/พอศท

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
ถนนสุนทรารายณ์ ขย ๓๖๒๓๐

๒) กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร ๒ IPV + ๓ OPV
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๖/๙๑๘๗
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอเทพสถิต ได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า ประเทศไทยได้มีการดำเนินงานโครงการกวาดล้างโรคโปลิโอตามพันธสัญญานานาชาติ โดยมีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนเป็นมาตรการสำคัญมาโดยตลอด ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำให้เด็กเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) จำนวน ๕ ครั้ง เมื่อเด็กอายุ ๒ เดือน ๔ เดือน ๖ เดือน ๑ ปี ๖ เดือน และ ๔ ปี และได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (IPO) จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อเด็กอายุ ๔ เดือน จึงส่งแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอสูตร 2 IPV + 3 OPV เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับดำเนินการนำร่องวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV

จึงประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด ได้รับทราบแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://bit.ly/3JNi7G2> หรือ QR-Code รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

เรียน นางก อบต.บ้านไร่
หรือโปรดทราบ
แจ้ง.....
เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป
(นางสาววสันดา จังโกฏี)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(เอกพล เรืองเพชร)
ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน
นายอำเภอเทพสถิต

- 1493/นส
- 104๘๕๕/๖๖๑๐๖๖
หรือ
นาง. A.
(สมชาติ ด้ายรินรัมย์)
หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร ๐-๔๘๘๕-๕๐๖๖

โปรดส่งการ

(นายมนตรี สติระวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

นางก อบต.บ้านไร่

“กานิดแม่ น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรารภคู่เป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ
สมบูรณป่าเขาสรรพสัตว์ เต็นชัฒยาผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี”

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๒/๙๑ คสท



ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
รับที่ ๒๓๓ / ๒๓๓
วันที่ 26 ก.ค. 2566
เวลา

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรมไตรมิตรชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เลขที่รับ ๓๓๒ / ๒๒

วันที่ 25 ก.ค. 2566

เรื่อง แจ้งแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร ๒ IPV + ๓ OPV

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๒๘๘๘ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า ประเทศไทยได้มีการดำเนินงานโครงการกวาดล้างโรคโปลิโอตามพันธสัญญานานาชาติ โดยมีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนเป็นมาตรการสำคัญมาโดยตลอด ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำให้เด็กเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) จำนวน ๕ ครั้ง เมื่อเด็กอายุ ๒ เดือน ๔ เดือน ๖ เดือน ๑ ปี ๖ เดือน และ ๔ ปี และได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPO) จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อเด็กอายุ ๔ เดือน จึงส่งแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอสูตร 2 IPV + 3 OPV เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับดำเนินการในการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV

จังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด ได้รับทราบแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอสูตร 2 IPV + 3 OPV ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://bit.ly/3JNi7G2> หรือ QR-Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วยเช่นกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ ไตรศุกดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

- เรียน นายอำเภอเทพสถิต
- เพื่อโปรดทราบ
- จักรวรรดิแก้ว แนวทางการนำร่องฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคโปลิโอ สูตร ๒ IPV + ๓ OPV

- แนบแผนผัง อปท ทกแห่งทราบแล้ว

ดำเนินการต่อไป

25 ก.ค. 2566

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
26 ก.ค. 2566

ว่าที่ร้อยตรี

(เดชาพล เมืองเพชร)

ปลัดอำเภอ รักษาการแทน

นายอำเภอเทพสถิต

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร./โทรสาร ๐๔๔-๘๒๒๒๐๓

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๒๕๖๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว ๓๕๙
ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า ประเทศไทยได้มีการดำเนินงานโครงการกวาดล้างโรคโปลิโอตามพันธสัญญานานาชาติ โดยมีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนเป็นมาตรการสำคัญมาโดยตลอด ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำให้เด็กเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) จำนวน ๕ ครั้ง เมื่อเด็กอายุ ๒ เดือน ๔ เดือน ๖ เดือน ๑ ปี ๖ เดือน และ ๕ ปี และได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อเด็กอายุ ๕ เดือน ในกรณีนี้ จึงส่งแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอสูตร 2 IPV + 3 OPV เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับดำเนินการในการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด ได้รับทราบแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://bit.ly/3JN17G2> หรือ QR-Code ท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรค

โทรศัพท์ที่ ๐ ๒๒๕.๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว / นายศักดิ์พัฒน์ อนุจันทร์

ด่วนที่สุด

ที่ สอ ๐๔๑๐.๑๒/ว ๓๕๖๖



ป/ร.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ ๒๙๓๕๐
วันที่ - ๕ ก.ค. 2566
เวลา

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์

จังหวัดนนทบุรี
เลขรับ ๑๘๓๑
วันที่ ๕ ก.ค. 2566
เวลา ๑๖.๑๖ น.

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ประเทศไทยได้มีการดำเนินงานโครงการกวาดล้างโรคโปลิโอตามพันธสัญญานานาชาติ โดยมีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนเป็นมาตรการสำคัญมาโดยตลอด ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำให้เด็กเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) จำนวน ๕ ครั้ง เมื่อเด็กอายุ ๒ เดือน ๔ เดือน ๖ เดือน ๑ ปี ๒ เดือน และ ๔ ปี และได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อเด็กอายุ ๔ เดือน อย่างไรก็ตาม จากการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การประชุมร่วมระหว่างกรมควบคุมโรค ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดต่อเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และการประชุม คณะกรรมการบริหารงานวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้เห็นชอบคำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อเด็กอายุ ๒ เดือน และ ๔ เดือน และให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) จำนวน ๓ ครั้ง เมื่อเด็กอายุ ๖ เดือน ๑ ปี ๒ เดือน และ ๔ ปี (สูตร 2 IPV + 3 OPV) และเพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมฯ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดประชุมมอบนโยบายและชี้แจงโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนการกวาดล้างโรคโปลิโอตามพันธสัญญานานาชาติด้วยการนำร่องให้วัคซีนโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ณ กรมควบคุมโรค และผ่านระบบการประชุมทางไกล นั้น

กระทรวงสาธารณสุข ขอส่งแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับดำเนินการในการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV และขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดของท่านได้รับทราบและดำเนินการต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ สายวงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาบริการ รร.ร.ร.ร.
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๖๓ ๓๓๔๖ - ๗

โทรสาร -



**แนวทางการนำร่อง
ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
สูตร 2  PV + 3 OPV**



มิถุนายน 2566

แนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV

มิถุนายน 2566

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยได้จัดบริการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอแก่เด็กกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันโรคโปลิโอมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก ได้เข้าร่วมโครงการกวาดล้างโรคโปลิโอเช่นเดียวกับนานาประเทศ โดยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนยังคงเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญมาโดยตลอด ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำให้เด็กเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) จำนวน 5 ครั้ง เมื่อเด็กอายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน และ 4 ปี และได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) จำนวน 1 ครั้ง เมื่อเด็กอายุ 4 เดือน ตามมติคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เด็กกลุ่มเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอต่อการป้องกันเชื้อโปลิโอทุกสายพันธุ์ รวมถึงลดผลข้างเคียงจากการรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (VAPP) อีกทั้งเป็นการปรับคำแนะนำการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จึงได้มีมติแนะนำให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) จำนวน 2 ครั้ง เมื่อเด็กอายุ 2 เดือน และ 4 เดือน และให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) จำนวน 3 ครั้ง เมื่อเด็กอายุ 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน และ 4 ปี

ประกอบกับจากสถานการณ์โรคโปลิโอทั่วโลกในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบแนวโน้มการระบาดเพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศรวมถึงประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทย โดยเฉพาะโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์สายพันธุ์ที่ 2 (cVDPV2) แม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบผู้ป่วยโปลิโอมาตั้งแต่ปี 2540 แต่ยังคงมีความเสี่ยงสูงที่เชื้อโปลิโอจะแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยได้

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 จึงได้มีการประชุมเพื่อหารือคำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอระหว่างกรมควบคุมโรค ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และได้มีมติให้นำร่องการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) จำนวน 2 ครั้ง เมื่อเด็กอายุ 2 เดือน และ 4 เดือน และให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) จำนวน 3 ครั้ง เมื่อเด็กอายุ 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน และ 4 ปี (สูตร 2 IPV + 3 OPV) ทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเริ่มดำเนินการนำร่องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

กระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จึงได้จัดทำแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยบริการวัคซีน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

แนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV

1. คำแนะนำการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV

1.1 แนะนำให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (Inactivated Poliomyelitis Vaccine : IPV)

จำนวน 2 เข็ม เมื่อเด็กอายุ 2 เดือน และ 4 เดือน และ

1.2 ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (Oral Poliomyelitis Vaccine : OPV)

จำนวน 3 ครั้ง เมื่อเด็กอายุ 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน และ 4 ปี



2. กลุ่มเป้าหมาย

เด็กอายุครบ 2 เดือนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอมาก่อน

3. พื้นที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

4. ระยะเวลาการนำร่อง

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

5. การให้บริการฉีดวัคซีน

ขอให้สถานบริการดำเนินการตามมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

6. แนวทางการเบิก - จ่ายวัคซีน

เบิกจ่ายวัคซีนผ่านระบบ Vendor Managed Inventory (VMI) ขององค์การเภสัชกรรม เช่นเดียวกับวัคซีนพื้นฐานอื่นๆ ที่บริหารจัดการภายใต้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

7. การบันทึกข้อมูล

7.1 บันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีเขียว)

7.2 บันทึกในโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล 43 แฟ้ม)

โดยมีรหัสวัคซีน ดังนี้

ลำดับ	วัคซีน ภาษาอังกฤษ	รหัสวัคซีน	รหัส ICD- 10-TM	อายุที่ได้รับ วัคซีน (เดือน)	หมายเหตุ
1	IPV1	I11	Z24.0	อายุ 2 เดือน	
2	IPV2	I12	Z24.0	อายุ 4 เดือน	
3	IPV3	I13	Z24.0	อายุ 6 เดือน	
4	IPV4	I14	Z24.0	อายุ 1 ปี 6 เดือน	
5	IPV5	I15	Z24.0	อายุ 4 ปี	
6	IPV-P	401	Z24.0	อายุ 4 เดือน	(ยกเลิก ตั้งแต่ 1 ก.ค. 66)
1	OPV1	O81	Z24.0	2 เดือน	
2	OPV2	O82	Z24.0	4 เดือน	
3	OPV3	O83	Z24.0	อายุ 6 เดือน	
4	OPV4	O84	Z24.0	อายุ 1 ปี 6 เดือน	
5	OPV5	O85	Z24.0	อายุ 4 ปี	

การบันทึกข้อมูลการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV

วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV)			วัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV)		
IPV1 (รหัส I11)	2 เดือน	✓	OPV1 (รหัส O81)	2 เดือน	✗
IPV2 (รหัส I12)	4 เดือน	✓	OPV2 (รหัส O82)	4 เดือน	✗
IPV3 (รหัส I13)	6 เดือน	✗	OPV3 (รหัส O83)	6 เดือน	✓
IPV4 (รหัส I14)	1 ปี 6 เดือน	✗	OPV4 (รหัส O84)	1 ปี 6 เดือน	✓
IPV5 (รหัส I15)	4 ปี	✗	OPV5 (รหัส O85)	4 ปี	✓

กรณี เด็กที่ยังคงได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) 5 ครั้ง เมื่อเด็กอายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน และ 4 ปี และได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) 1 ครั้ง เมื่อเด็กอายุ 4 เดือน (สูตรเดิม) ให้บันทึกข้อมูล ดังนี้

วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV)			วัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV)		
IPV1 (รหัส 111)	2 เดือน	✗	OPV1 (รหัส 081)	2 เดือน	✓
IPV2 (รหัส 112)	4 เดือน	✓	OPV2 (รหัส 082)	4 เดือน	✓
IPV3 (รหัส 113)	6 เดือน	✗	OPV3 (รหัส 083)	6 เดือน	✓
IPV4 (รหัส 114)	1 ปี 6 เดือน	✗	OPV4 (รหัส 084)	1 ปี 6 เดือน	✓
IPV5 (รหัส 115)	4 ปี	✗	OPV5 (รหัส 085)	4 ปี	✓

8. ค่าบริการฉีดวัคซีนและเงินช่วยเหลือเบื้องต้น/การเยียวยา กรณีได้รับความเสียหายหรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีน

ดำเนินการภายใต้ระบบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เช่นเดียวกับวัคซีนปกติ

9. การเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการรับวัคซีน

ขอให้สถานบริการดำเนินการตามแนวทางการเฝ้าระวังและตอบโต้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ภายหลังได้รับการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

แผนการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV

พื้นที่ : 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

เป้าหมายและเดือนที่รับวัคซีน	IPV 1 (2 เข็ม)	IPV 2 (4 เข็ม)	OPV (6 เข็ม)	OPV (1 ปี 6 เดือน)	OPV (4 ปี)
เด็กที่เกิด 1-31 พฤษภาคม 2566	ก.ค. 66	ก.ย. 66	พ.ย. 66	พ.ย. 67	ก.ค. 70
เด็กที่เกิด 1-30 มิถุนายน 2566	ต.ค. 66	ต.ค. 66	ธ.ค. 66	ธ.ค. 67	มิ.ย. 70
เด็กที่เกิด 1-31 กรกฎาคม 2566	ก.ย. 66	พ.ย. 66	ม.ค. 67	ม.ค. 68	ก.ค. 70
เด็กที่เกิด 1-31 สิงหาคม 2566	ต.ค. 66	ธ.ค. 66	ก.พ. 67	ก.พ. 68	ธ.ค. 70
เด็กที่เกิด 1-30 กันยายน 2566	พ.ย. 66	ม.ค. 67	มี.ค. 67	มี.ค. 68	ก.ย. 70
เด็กที่เกิด 1-31 ตุลาคม 2566	ธ.ค. 66	ก.พ. 67	พ.ย. 67	พ.ย. 68	ธ.ค. 70
เด็กที่เกิด 1-30 พฤศจิกายน 2566	ม.ค. 67	มี.ค. 67	พ.ค. 67	พ.ค. 68	ก.ย. 70
เด็กที่เกิด 1-31 ธันวาคม 2566	ก.ย. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ธ.ค. 68	ก.ค. 70

วัคซีน IPV วัคซีน OPV



สปลสช.
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรค



ประกาศ

เรื่อง ความร่วมมือขับเคลื่อนการกวาดล้างโรคโปลิโอตามพันธสัญญานานาชาติ

ด้วยการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ประเทศไทยได้มีมาตรการภายใต้โครงการกวาดล้างโปลิโอมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 และกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีแนวโน้มผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง และสามารถคงสถานะการปลอดเชื้อไวรัสโปลิโอในประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ตามยุทธศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก

จากการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และทางประชุมร่วมระหว่างกรมควบคุมโรค ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ปรับคำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอเพื่อลดผลข้างเคียงจากการรับวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน ดังนี้



ด้วยการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ กระทรวงสาธารณสุขจะเริ่มดำเนินโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนการกวาดล้างโรคโปลิโอตามพันธสัญญานานาชาติด้วยการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV โดยเริ่มดำเนินการนำร่องทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อขับเคลื่อนการกวาดล้างโปลิโอให้บรรลุเป้าหมายในการกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปเช่นเดียวกับนานาประเทศ

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2566

ลงชื่อ.....ฝ่ายที่หนึ่ง
(นายแพทย์ณรงค์ หาร่วงศ์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ลงชื่อ.....ฝ่ายที่สอง
(นายแพทย์หญิง เจริญ ธรรมเสี้ยว)
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ลงชื่อ.....ฝ่ายที่สาม
(นายแพทย์ณรงค์ หาร่วงศ์)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

ลงชื่อ.....ฝ่ายที่สี่
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์ ใต้ถื่น)
ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ลงชื่อ.....ฝ่ายที่ห้า
(นายแพทย์ณรงค์ หาร่วงศ์)
ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

1. เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงโครงการความร่วมมือ
ขับเคลื่อน การกวาดล้างโรคโปลิโอตามพันธสัญญานานาชาติ ด้วยการนำร่อง
ให้วัคซีนโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566



• สามารถดาวน์โหลดเอกสารประชุมฯ ได้ที่เว็บไซต์กองโรคติดต่อทั่วไป
ที่ลิงค์ : <https://shorturl-ddc.moph.go.th/nT2hf> หรือ QR code ด้านบน

2. แนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV



• สามารถดาวน์โหลดแนวทางฯ ได้ที่เว็บไซต์กองโรคติดต่อทั่วไป
ที่ลิงค์ : <https://shorturl-ddc.moph.go.th/LIHE1> หรือ QR code ด้านบน